

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP -2-4-68 767740

BULLETIN
TECHNIQUE
DES STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION DE CLERMONT-FERRAND

(Tél. 92-97-11 - Postes 440 & 449)

(ALLIER, CANTAL, CORRÈZE, CREUSE, HAUTE-LOIRE, HAUTE-VIENNE, PUY-DE-DOME)

Régie de Recettes D.D.A. - Sous-Régisseur de la Protection
des Végétaux - Cité Administrative - 63 CLERMONT-FERRAND.
C. C. P. : CLERMONT-FERRAND 5.503-17

ABONNEMENT ANNUEL

25,00 F

Supplément n° 1 au Bulletin n° 90 de MARS 1968.-

A V E R T I S S E M E N T .-

P O I R I E R S

TAVELURE DU POIRIER.-

Dans certains vergers de Poiriers, des attaques graves peuvent avoir lieu, précocement, à partir des germes (conidies) se formant sur les pustules chancreuses de Tavelure installées sur les rameaux.

Dans les endroits favorables à la Tavelure, sur les variétés sensibles, il est conseillé d'effectuer un traitement cuprique soigné dès que les bourgeons floraux auront atteint le stade C3 (voir, au verso, le tableau des stades-repères du Poirier)

Intervenir immédiatement, si les arbres ont atteint ou dépassé ce stade. Dans les départements de la Corrèze et de la Haute-Vienne, ce traitement, à effectuer dès le stade C3, est à généraliser, une quantité non négligeable de spores (ascospores) arrivant à maturité dans les périthèces, autre forme de conservation hivernale de la maladie.

I N F O R M A T I O N S .-

A R B R E S F R U I T I E R S

ANTHONOME DU POMMIER.-

Dans les vergers bien exposés, l'insecte est entré en activité. Là où des dégâts sont à craindre, intervenir, par beau temps, dans les jours qui suivent le débourrement (bourgeons floraux légèrement éclatés, laissant apparaître un "bout blanc").

Dans les situations intéressées, si ce stade est atteint, le traitement est à effectuer dès que possible.

OIDIUM DU POMMIER.-

Dans les vergers intéressés par cette maladie, les traitements sont à entreprendre dès le débourrement.

Les traitements doivent être fréquents et les pulvérisations abondantes (pour les produits à utiliser, consulter la liste transmise récemment).

MONILIA DES ARBRES FRUITIERS A NOYAU.-

Comme il a été conseillé précédemment, intervenir dès le débourrement. Sur Abricotiers, effectuer un second traitement, juste avant la floraison.

Clermont-Ferrand, le 25 Mars 1968.

Le Contrôleur chargé des
Avertissements Agricoles

A. LECLERC.

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux

P. DENIZET.

Imprimerie de la Station de CLERMONT-FERRAND
Directeur-Gérant : L. BOUYX.

Tirage n° 676 du 25 Mars 1968 - 2 200 exemplaires - ABONNEMENT 1968 - Expédition n° 3.

P 191

DÉVELOPPEMENT DES ORGANES DE FRUCTIFICATION DES ARBRES FRUITIERS

TABEAU N° 1 - STADES-REPÈRES DU POIRIER

